



BOLLETTINO NEVE E VALANGHE DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA


N. 48 DEL 20/03/2023

Prossimo aggiornamento il 22/03/2023 entro le ore 16:00

www.protezionecivile.fvg.it/it/bollettino-valanghe




Neve al suolo -HS- ore 8:00 del 20/03/2023 : stima della distribuzione per i settori alpini [cm]




Stazione	Quota stazione (m)	Neve al suolo Hs (cm)	Neve fresca Hn (cm)	Hn3gg (cm)
Rifugio Tamai - Zoncolan	1700	41	1	0
Piancavallo	1275	2	0	0
Varmost M.te Simone	1870	65	0	0
Livinal Lunc	1837	192	0	0
Tarvisio S+M	794	1	0	0

Mattina




pomeriggio



Grado Pericolo 2 - Moderato

AM:



Tendenza: Pericolo valanghe stabile
per Mercoledì il 22.03.2023




Neve bagnata



1600m

PM:



1600m

Tendenza: Pericolo valanghe stabile



Neve bagnata



1600m

La superficie del manto nevoso non riuscirà a rigelarsi bene e si ammorbidirà nel corso della giornata. Con il rialzo termico diurno, nel corso della giornata il pericolo di valanghe umide e bagnate aumenterà.

Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, nel corso della giornata il pericolo di valanghe umide aumenterà progressivamente al grado 2 "moderato". Sui pendii estremamente ripidi e ai piedi di pareti rocciose e dietro ai cambi di pendenza, sono possibili valanghe umide spontanee, anche di medie dimensioni. Inoltre è necessario fare attenzione agli accumuli di neve ventata. Gli accumuli di neve ventata per lo più di piccole dimensioni possono, a livello isolato, subire un distacco in seguito al passaggio di un singolo appassionato di sport invernali al di sopra dei 2000 m circa.

Le escursioni e le discese fuori pista dovrebbero iniziare e terminare presto.

Manto nevoso

Situazione tipo

st.10: situazione primaverile

La superficie del manto nevoso si ammorbidirà nel corso della giornata. Ciò soprattutto sui pendii soleggiati ripidi. Il legame tra i vari accumuli di neve ventata e quello tra i vari accumuli di neve ventata e la neve vecchia è per lo più buono.

Tendenza


La superficie del manto nevoso si ammorbidirà nel corso della giornata. Con il rialzo termico e l'irradiazione



solare diurni, nel corso della giornata il pericolo di valanghe umide e bagnate aumenterà progressivamente.



Grado Pericolo 1 - Debole



Tendenza: Pericolo valanghe stabile
per Mercoledì il 22.03.2023



Neve bagnata



Sulle Prealpi orientali è presente solo poca neve.

Con il rialzo termico diurno, sui pendii ripidi sono possibili isolate valanghe di piccole dimensioni.

Manto nevoso

Situazione tipo

st.10: situazione primaverile

La superficie del manto nevoso si ammorbidirà nel corso della giornata.


Tendenza

La superficie del manto nevoso si ammorbidirà nel corso della giornata.



Grado Pericolo 1 - Debole

AM:



Tendenza: Pericolo valanghe stabile
per Mercoledì il 22.03.2023




Neve bagnata



1700m

PM:



Tendenza: Pericolo valanghe stabile
per Mercoledì il 22.03.2023



La superficie del manto nevoso si ammorbidirà nel corso della giornata.

Nelle zone in prossimità delle creste, nelle conche e nei canali e ai piedi di pareti rocciose e dietro ai cambi di pendenza, sono possibili valanghe umide spontanee, ma per lo più solo di piccole dimensioni. Le valanghe umide possono distaccarsi in modo provocato o spontaneo. Isolati punti pericolosi si trovano soprattutto sui pendii ripidi ombreggiati in quota come pure nelle zone in prossimità delle creste, nei canali e nelle conche.

Le escursioni e le discese fuori pista dovrebbero iniziare e terminare in tempo.

Manto nevoso

Situazione tipo

st.10: situazione primaverile


La superficie del manto nevoso si ammorbidirà nel corso della giornata. Il legame con la neve vecchia degli accumuli di neve ventata è per lo più buono.

Tendenza


La superficie del manto nevoso si ammorbidirà nel corso della giornata. Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, nel corso della giornata il pericolo di valanghe umide e bagnate aumenterà progressivamente.



Mattina




pomeriggio



Grado Pericolo 2 - Moderato

AM:



Tendenza: Pericolo valanghe stabile
per Giovedì il 23.03.2023




Neve bagnata



1700m

PM:



1700m

Tendenza: Pericolo valanghe stabile



Neve bagnata



1700m

La superficie del manto nevoso non riuscirà a rigelarsi bene e si ammorbidirà nel corso della giornata. Con il rialzo termico diurno, nel corso della giornata il pericolo di valanghe umide e bagnate aumenterà.

Nelle zone in prossimità delle creste, nelle conche e nei canali e ai piedi di pareti rocciose e dietro ai cambi di pendenza, sono possibili valanghe umide spontanee, ma per lo più solo di piccole dimensioni. Le valanghe umide possono distaccarsi in modo provocato o spontaneo. Isolati punti pericolosi si trovano soprattutto sui pendii ripidi ombreggiati in quota come pure nelle zone in prossimità delle creste, nei canali e nelle conche.

Le escursioni e le discese fuori pista dovrebbero iniziare e terminare in tempo.

Manto nevoso

Situazione tipo

st.10: situazione primaverile

La superficie del manto nevoso si ammorbidirà nel corso della giornata. Il legame con la neve vecchia de(-)gli accumuli di neve ventata è per lo più buono.


Tendenza

La superficie del manto nevoso si ammorbidirà nel corso della giornata. Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, nel corso della giornata il pericolo di valanghe umide e bagnate aumenterà progressivamente.



Grado Pericolo 2 - Moderato

AM:



Tendenza: Pericolo valanghe stabile
per Giovedì il 23.03.2023




Neve bagnata



1600m

PM:



1600m

Tendenza: Pericolo valanghe stabile



Neve bagnata



1600m

La superficie del manto nevoso non riuscirà a rigelarsi bene e si ammorbidirà nel corso della giornata. Con il rialzo termico diurno, nel corso della giornata il pericolo di valanghe umide e bagnate aumenterà.

Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, nel corso della giornata il pericolo di valanghe umide aumenterà progressivamente al grado 2 "moderato". Sui pendii estremamente ripidi e ai piedi di pareti rocciose e dietro ai cambi di pendenza, sono possibili valanghe umide spontanee, anche di medie dimensioni. Inoltre è necessario fare attenzione agli accumuli di neve ventata. Gli accumuli di neve ventata per lo più di piccole dimensioni possono, a livello isolato, subire un distacco in seguito al passaggio di un singolo appassionato di sport invernali al di sopra dei 2000 m circa.

Le escursioni e le discese fuori pista dovrebbero iniziare e terminare presto.

Manto nevoso

Situazione tipo

st.10: situazione primaverile

La superficie del manto nevoso si ammorbidirà nel corso della giornata. Ciò soprattutto sui pendii soleggiati ripidi. Il legame tra i vari accumuli di neve ventata e quello tra i vari accumuli di neve ventata e la neve vecchia è per lo più buono.

Tendenza


La superficie del manto nevoso si ammorbidirà nel corso della giornata. Con il rialzo termico e l'irradiazione



solare diurni, nel corso della giornata il pericolo di valanghe umide e bagnate aumenterà progressivamente.



Grado Pericolo 1 - Debole



Tendenza: Pericolo valanghe stabile
per Giovedì il 23.03.2023



Neve bagnata



Sulle Prealpi orientali è presente solo poca neve.

Con il rialzo termico diurno, sui pendii ripidi sono possibili isolate valanghe di piccole dimensioni.

Manto nevoso

Situazione tipo

st.10: situazione primaverile

La superficie del manto nevoso si ammorbidirà nel corso della giornata.

Tendenza

La superficie del manto nevoso si ammorbidirà nel corso della giornata.

