




BOLLETTINO NEVE E VALANGHE DELLA

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA


n°18 di venerdì 26/01/2024

Prossimo aggiornamento lunedì 29/01/2024 entro le ore 16:00


Neve al suolo -HS- ore 8:00 del 26/01/2024 : stima della distribuzione per i settori alpini [cm]



Stazione	Quota stazione (m)	Neve al suolo Hs (cm)	Neve fresca Hn (cm)	Hn3gg (cm)
Rifugio Tamai - Zoncolan	1700	35	0	1
Piancavallo	1275	14	1	0
Varmost M.te Simone	1870	57	0	0
Livinal Lunc	1837	167	0	0
Tarvisio S+M	794	6	0	0




Grado Pericolo 2 - Moderato



Tendenza: Pericolo valanghe stabile
per Domenica il 28.01.2024 →



Neve ventata



Neve bagnata



Linea del bosco

Gli accumuli di neve ventata degli ultimi giorni rappresentano la principale fonte di pericolo.

In molte regioni il tempo sarà mite.

Il manto nevoso è estremamente variabile a distanza di pochi metri in molti punti. I punti pericolosi si trovano soprattutto nelle zone in prossimità delle creste, nelle conche e nei canali al di sopra del limite del bosco. Gli accumuli di neve ventata possono subire un distacco soprattutto in caso di forte sovraccarico a tutte le esposizioni in quota.

Con il rialzo termico diurno, la probabilità di distacco di valanghe umide spontanee aumenterà progressivamente soprattutto sui pendii soleggiati ripidi alle quote medie e alte.

Manto nevoso

Gli accumuli di neve ventata poggiano su strati fragili.

Sulla dura superficie del manto nevoso sussiste un pericolo di caduta nelle zone ripide. Nel corso della giornata l'irradiazione solare causerà un progressivo inumidimento del manto nevoso.

Tendenza


Ulteriore rialzo termico in molte regioni sino in alta montagna.



Grado Pericolo 1 - Debole



Tendenza: Pericolo valanghe in aumento
per Domenica il 28.01.2024



Neve bagnata




1700m



Neve ventata



1700m



Valanghe di
slittamento



1700m

In molte regioni il tempo sarà mite. Continuo rialzo termico in molte regioni sino in alta montagna.

Con il rialzo termico, la probabilità di distacco di valanghe umide spontanee aumenterà progressivamente soprattutto sui pendii soleggiati ripidi. Sono possibili valanghe spontanee di piccole e, a livello isolato, di medie dimensioni.

Gli accumuli di neve ventata possono subire un distacco soprattutto in caso di forte sovraccarico. I punti pericolosi si trovano soprattutto nelle conche, nei canali e dietro ai cambi di pendenza come pure nelle zone in prossimità delle creste e dei passi.

Manto nevoso

Il sole e il calore causeranno nel corso della giornata un progressivo inumidimento del manto nevoso.


Sulla dura superficie del manto nevoso sussiste un pericolo di caduta nelle zone ripide.

Al di sotto dei 1500 m circa è presente solo poca neve.


Tendenza

Rialzo termico al di sopra del limite del bosco.






Grado Pericolo 2 - Moderato



Tendenza: Pericolo valanghe stabile →
per Lunedì il 29.01.2024



Neve bagnata



Valanghe di
slittamento



In molte regioni il tempo sarà mite. Continuo rialzo termico in molte regioni sino in alta montagna.

Le escursioni dovrebbero terminare presto.

Con il rialzo termico, la probabilità di distacco di valanghe umide spontanee aumenterà progressivamente soprattutto sui pendii soleggiati ripidi. Sono possibili valanghe spontanee di medie e, a livello isolato, di grandi dimensioni.

Gli accumuli di neve ventata possono subire un distacco soprattutto in caso di forte sovraccarico. I punti pericolosi si trovano soprattutto nelle conche, nei canali e dietro ai cambi di pendenza come pure nelle zone in prossimità delle creste e dei passi.

Manto nevoso

Il sole e il calore causeranno nel corso della giornata un netto inumidimento del manto nevoso.

Sulla dura superficie del manto nevoso sussiste un pericolo di caduta nelle zone ripide.


Al di sotto dei 1500 m circa è presente solo poca neve.

Tendenza

Rialzo termico al di sopra del limite del bosco.




Grado Pericolo 2 - Moderato



Tendenza: Pericolo valanghe stabile →
per Lunedì il 29.01.2024



Neve ventata




1800m



Neve bagnata



Linea del bosco



Valanghe di
slittamento



2300m
Linea del bosco

Gli accumuli di neve ventata degli ultimi giorni devono essere valutati con attenzione.

I punti pericolosi e la probabilità di distacco aumenteranno nel corso della giornata.

Il manto nevoso è estremamente variabile a distanza di pochi metri in molti punti. I punti pericolosi si trovano soprattutto nelle zone in prossimità delle creste, nelle conche e nei canali al di sopra del limite del bosco. Gli accumuli di neve ventata possono subire un distacco soprattutto in caso di forte sovraccarico a tutte le esposizioni in quota.

Con il rialzo termico diurno, la probabilità di distacco di valanghe umide spontanee aumenterà progressivamente soprattutto sui pendii soleggiati ripidi al di sotto del limite del bosco. Sono possibili valanghe di medie e, a livello isolato, di grandi dimensioni.

Manto nevoso


Gli accumuli di neve ventata poggiano su strati fragili.

Sulla dura superficie del manto nevoso sussiste un pericolo di caduta nelle zone ripide. Nel corso della giornata l'irradiazione solare causerà un netto inumidimento del manto nevoso.


Tendenza

Ulteriore rialzo termico in molte regioni sino in alta montagna.






Grado Pericolo 2 - Moderato




Tendenza: Pericolo valanghe stabile →
per Martedì il 30.01.2024



Neve ventata



Neve bagnata



Valanghe di
slittamento



I punti pericolosi e la probabilità di distacco aumenteranno nel corso della giornata. Le escursioni dovrebbero terminare presto. Gli accumuli di neve ventata degli ultimi giorni devono essere valutati con attenzione.

Il manto nevoso è estremamente variabile a distanza di pochi metri in molti punti. I punti pericolosi si trovano soprattutto nelle zone in prossimità delle creste, nelle conche e nei canali al di sopra del limite del bosco. Gli accumuli di neve ventata possono subire un distacco soprattutto in caso di forte sovraccarico a tutte le esposizioni in quota.

Con il rialzo termico diurno, la probabilità di distacco di valanghe umide spontanee aumenterà progressivamente soprattutto sui pendii soleggiati ripidi al di sotto del limite del bosco. Sono possibili valanghe di medie e, a livello isolato, di grandi dimensioni.

Manto nevoso

Gli accumuli di neve ventata poggiano su strati fragili.


Sulla dura superficie del manto nevoso sussiste un pericolo di caduta nelle zone ripide. Nel corso della giornata l'irradiazione solare causerà un netto inumidimento del manto nevoso.

Tendenza

Continuo rialzo termico in molte regioni sino in alta montagna. In molte regioni il tempo sarà molto mite.




Grado Pericolo 2 - Moderato



Tendenza: Pericolo valanghe stabile
per Martedì il 30.01.2024 →



Neve bagnata



Valanghe di
slittamento



Continuo rialzo termico in molte regioni sino in alta montagna.
Le escursioni dovrebbero terminare presto.

Con il rialzo termico, la probabilità di distacco di valanghe umide spontanee aumenterà progressivamente soprattutto sui pendii soleggiati ripidi. Sono possibili valanghe spontanee di medie e, a livello isolato, di grandi dimensioni.

Gli accumuli di neve ventata possono subire un distacco soprattutto in caso di forte sovraccarico. I punti pericolosi si trovano soprattutto nelle conche, nei canali e dietro ai cambi di pendenza come pure nelle zone in prossimità delle creste e dei passi.

Manto nevoso

Il sole e il calore causeranno nel corso della giornata un netto inumidimento del manto nevoso. Sulla dura superficie del manto nevoso sussiste un pericolo di caduta nelle zone ripide. Al di sotto dei 1500 m circa è presente solo poca neve.

Tendenza

Rialzo termico al di sopra del limite del bosco.

